

## HPV HR - badanie, które daje pewność...

Badanie HPV to innowacyjna metoda molekularna, która, daje jasną odpowiedź czy wirus HPV jest czy go nie ma. Test HPV to pierwszy krok w diagnostyce raka szyjki macicy.

## Czułość HPV HR to około 95%<sup>1</sup>

... a cytologia budzi wątpliwości

Cytologia konwencjonalna to badanie, które odkryto 70 lat temu. Polega ona na obserwacji zmian przez cytologa w laboratorium, w związku z tym jest potencjalnie obarczone ludzkim błędem.

## Czułość cytologii konwencjonalnej to około 50%<sup>1</sup>

**Dlaczego badanie HPV HR jest lepsze od konwencjonalnej cytologii?**

Ze względu na wyższą czułość, testy HPV HR pozwalają na wczesne wykrycie wirusa HPV i związanego z nim ryzyka rozwoju raka szyjki macicy, dając więcej czasu na działanie.

Czy wiesz, że ponad...



# 2000 Polek

co roku dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy!<sup>5</sup>

Choć ta liczba budzi niepokój, pamiętaj: wcześniej wykryty nowotwór jest niemal **w 100% wyleczalny**.<sup>7</sup>

Więcej informacji na: [wykryjhpv.pl](http://wykryjhpv.pl)



Partnerami kampanii są Fundacje:



NIE DAJ SIĘ HPV



\*Na rynku dostępne są testy do diagnostyki HPV różnych producentów, które mogą różnić się czułością w zależności od zastosowanej technologii oraz rodzaju zmian śródnamionkowych szyjki macicy (CIN). Wartość 95% odnosi się do szacowanej czułości testów HPV HR na podstawie: Ramírez et al. (2023), Lancet regional health. Americas vol. 26, 100593.

1. Ramírez et al. Lancet Reg Health Am. 2023;26:100593.
2. Zhang et al. Sig Transduct Target Ther. 2025;10:44.
3. Milano et al. Vaccines. 2023;11(6):1060.
4. Nowakowski et al. Ginekol Pol. 2007;78(9):709-14.
5. Krajowy Rejestr Nowotworów, 2023. onkologia.org.pl/sites/default/files/Szyjka\_macicy.pdf [Dostęp: 21.05.2026].
6. RCL, Projekt 12393606. legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12393606/katalog/13106600#13106600 [Dostęp: 06.06.2025].
7. Walboomers et al. J Pathol. 1999;189(1):12-9.

Opublikowane przez: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  
© 2026 Roche Diagnostics Polska

Badanie HPV HR

# 95%\*

Twojej pewności siebie!



**Badanie HPV HR to pierwszy krok w diagnostyce raka szyjki macicy.** To nowoczesne badanie przesiewowe, które daje jednoznaczną odpowiedź: czy wirus HPV jest, czy go nie ma. **Czułość badania HPV HR to około 95%, a cytologii konwencjonalnej tylko około 50%<sup>1</sup>.**



MC-PL-01394

## Pewność siebie to pewność własnego zdrowia.

Regularne badanie w kierunku wirusa HPV (ang. Human Papillomavirus) może uratować nie tylko Twoje zdrowie, ale nawet życie.

### Co należy wiedzieć o wirusie HPV?<sup>2</sup>

- HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który występuje powszechnie i może być przenoszony poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną błoną śluzową lub skórą, w tym podczas kontaktów seksualnych.
- Istnieje wiele typów HPV, ale tylko niektóre (typy wysokiego ryzyka - HR) mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy.
- Zakażenie HPV najczęściej nie daje żadnych objawów przez wiele lat, dlatego regularne badania są tak ważne.



Czy wiesz, że nawet...

**80%**  
**osób**

aktywnych seksualnie  
może być zakażonych  
wirusem HPV<sup>3</sup>

### Czy wirus HPV oznacza raka szyjki macicy?

Wykryty wirus HPV nie oznacza od razu raka szyjki macicy. Jest to informacja o tym, że istnieje zwiększone ryzyko rozwoju raka szyjki macicy, zwłaszcza w przypadku zakażeń wysokoonkogennymi typami wirusa HPV (HPV HR). Większość infekcji nie ma objawów, jest nieszkodliwa i zostaje wyeliminowana w sposób naturalny przez układ odpornościowy organizmu.

Jeśli infekcja HPV utrzymuje się i pozostaje niewykryta, może to prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Dlatego tak ważne jest, aby poddać się badaniom przesiewowym w kierunku obecności wirusa HPV.

### Co to jest badanie HPV HR?

Badanie HPV HR jest nowoczesną metodą diagnostyczną, która wykrywa obecność wysokoonkogennych typów wirusa HPV, które mogą skutkować rozwojem raka szyjki macicy jeszcze przed wystąpieniem zmian widocznych w badaniu cytologicznym.



Czy wiesz, że za niemal...

**99%**  
**zachorowań**

na raka szyjki macicy  
odpowiada onkogenny  
wirus brodawczaka  
ludzkiego (HPV)<sup>4</sup>

### Jak wygląda badanie?

Materiał do badania HPV HR pobierany jest w sposób identyczny jak do cytologii. Wymaz z szyjki macicy jest pobierany na podłoże płynne, co umożliwia wykonanie testu molekularnego HPV HR i płynnej cytologii (LBC) z jednej próbki.

### Za jakie choroby odpowiedzialny jest wirus HPV?<sup>4</sup>

1. Typy niskiego ryzyka wywołują brodawki skórne tzw. kurczaki lub brodawki płciowe (tzw. kłykciny kończyste). Kłykciny występują na zewnętrznych i wewnętrznych narządach płciowych, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn.

2. Typy wysokiego ryzyka zwane typami onkogennymi mogą wywoływać raka szyjki macicy, raka pochwy i raka sromu u kobiet, a u mężczyzn raka prącia, ale także nowotwory głowy i szyi – krtani, warg, języka.



Czy wiesz, że codziennie...

**10 Polek**

dowiaduje się, że ma raka  
szyjki macicy, 5 Polek  
umiera z powodu tej  
choroby<sup>5</sup>

### Kto może skorzystać z refundowanego badania HPV HR w ramach narodowego programu profilaktyki raka szyjki macicy?<sup>6</sup>

Do badania kwalifikują się kobiety w wieku od 25 do 64 lat:

- po 36 miesiącach od ostatniego przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy,
- co 5 lat dla ujemnego wyniku testu HPV HR, bez czynników ryzyka w wywiadzie,
- co 12 miesięcy dla kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne),

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat narodowego programu profilaktyki raka szyjki macicy, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym.